

PINNALLISEN TRAUMAHAAVAN JÄLKITILAN HOITO KOSTEUTTAVALLA SORBACT® GEL -SIDOKSELLA


Tekijä: Jaana Janhonen,
Sairaanhoitaja/ haavahoitaja LievestuoreenS eniorineuvola

TAUSTATIEDOT:

Kyseessä on 92-vuotias hoitolaitoksessa asuva rouva. Sairauksina on diabetes, sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti ja nivelrikko sekä kilpirauhasen vajaatoiminta. Käytössä on melko masiivinen lääkitys.

TARKOITUS:

Asiakas on hyvin iäkäs, paljon perussairauksia, diabetes. Verenkierto on huonoa sääriluun päällä, iho hyvin ohut. Ei lähdetty mekaanisesti mustaa, tiukkaa ”kakkua” poistamaan. Paikallishoitotuotteeksi valittiin Sorbact® Gel, joka pehmentää, kosteuttaa ja sitoo patogeeneja mikrobit sidokseen sekä puhdistaa katetta. Toisena sidoksena on polyuretaanikalvo. Sorbact® Gel ei saa olla kosketuksessa terveellä iholla, jotta iho ei maseroidu. Sidoksen vaihtoväli on 1-3 vrk haavatilanteen mukaan.



3.2.2014 Kaatumisen seurauksena hän loukkasi oikean jalan. Sääriluun päälle tuli n. 2 cm kokoinen palkeenkieli, joka pian rupeutui ilmeisesti kuivumisen takia.




6.3.2014 Haavahoitajan käynnillä sääriluun päällä on musta, kova, kuiva ”kaku”, ympärillä punoitusta. Iho on paperimaisen ohut ja sääri hyvin hoikka. Kipua ei haavalla ole.

TULOKSET:

Pehmentämällä iso, paksu, kuiva rupi hellävaraisesti vältyttiin tässä tapauksessa mahdollisesta mekaanisen puhdistuksen aiheuttamasta lisävauriosta haavalla. Sorbact® Gel hoiti punoituksen pois, sitomalla mikrobit sidokseen sekä pehmensi ja ikään kuin liotti ruven pois. Sidoksella oli miellyttävä potilaalle ja helppo toteuttaa henkilökunnalle.

TOTEUTUS:

Potilas on käynyt suihkussa ja haava-alue on suihkutettu lämpimällä vedellä. Haava-alue painellaan kuivaksi taitoksilla. Sorbact® Gel sidoksesta leikataan haavan kokoinen pala ja peitetään polyuretaanikalvolla. Ympärysiho rasvataan perusvoiteella. Seuraavana päivänä punoitus oli hävinnyt ruven reunoilta. Neljä päivää hoidon aloituksesta paksu rupi oli hävinnyt, siisti granulaatio alla. Haavapinta suojattiin kosteutta ylläpitävällä Sorbact® Gel sidoksella. Sidoksella saa olla nyt paikallaan 3 vrk.



24.3.2014. Haava kiinni, epitelisaatio. Haava-alueen suojaus.