

# NRO 1 SORBACT® TAPAUSSELOSTE

Tapausselosteen tekijä: Maria Nevalainen, auktorisoitu haavahoitaja, Heinolan terveyskeskus

**HAAVATYYPI**  
LASKIMOPERÄINEN SÄÄRIHAAVA

**TUOTE**  
Sorbact® Gel

**HOITAJAKSO**  
4.6.2015-19.2.2016

## HAAVAN JA POTILAAN TAUSTA

Kyseessä 70-vuotias nainen, jolla perussairauksina COPD ja verenpainetauti. Keväällä 2014 rouvalla todettu ASO - tauti. Aiemmin rouva on tupakoinut runsaasti, mutta onnistunut sittemmin vähentämään sitä.

Toukokuussa 2015 vasemman jalan mediaalimalleolin seudulle on syntynyt haava turvotuksen seurauksena. Haava on kooltaan 0.5 x 1 cm. Turvotuksen takana verenpainelääkitys. Haavaa on aluksi hoidettu muutama kuukausi sairaanhoitajan vastaanotolla.

## HOITOMENETELMÄN KUVAUS

Alussa haava hoidettiin erilaisilla paikallishoitosidoksilla, joilla saatiin hyvä hoitovaste. Hyvän alun jälkeen haavan paraneminen kuitenkin pysähtyi.

**4.6.2015** aloitettiin Sorbact® Gel hoito. Haava kooltaan 1.6 x 1.7 cm. Haavapohjassa on hentoa, tiukkaa katetta. Haavaa ympäröivä iho on hyvin herkkä ja siksi hoidon alussa toisena sidoksena kokeiltu erityyppisiä imeviä sidoksia.

**2.7.2015** Sorbact® gel- sidoksen päälle toiseksi sidokseksi vaihdetaan Sorbact® Foam 10x10 cm. Alussa sidoksesta leikataan puolikas ja myöhemmin on riittänyt ¼ sidoksesta.

**19.2.2016** haavan koko on 1 x 0.8 cm. Haava pienenee hyvin ja katteisuutta ei enää ole.

**Hoidon aikaväli** Hoito alkoi 4.6.2015. Potilas käy haavahoitajalla 2 x viikossa ja vaihtaa viikonloppuisin itse sidoksen, erityksestä riippuen.

